



ECOGRAFÍA DOPPLER DE PENE

¿QUE ES UNA ECOGRAFÍA DOPPLER DE PENE? El Doppler de Pene es un estudio diagnóstico mediante ultrasonido, en el cual se examina el flujo sanguíneo y se determina si existe alguna patología. El examen no es doloroso y consiste en la realización de una ecografía completa del pene en estado de flacidez y posteriormente en erección para lo cual se inyecta en el órgano un medicamento (Caverjet) que produce la erección, para analizar con ultrasonido la velocidad de la sangre dentro de arterias y venas.

Preparación para el examen

- No tener relaciones sexuales o masturbación el día anterior y el día del examen.
- Llegue al examen con ropa ligera y cómoda; en el momento del examen se le suministrará una bata.
- El estudio es realizado en un ambiente seguro, sin embargo, le recomendamos dejar sus objetos de valor en casa.
- Debe traer los exámenes de Laboratorio tomados con una anticipación menor a un (1) Mes de TPT, TP.
- El día del examen traiga una (1) ampolla de 10 mcg de **Caverject**, *lo recomendable es comprar el medicamento justo antes de su cita ya que el medicamento debe conservarse entre los 2°C y 8°C.*
- Es **importante** que traiga sus estudios anteriores de la región a evaluar, si los tiene, esto permitirá un mejor diagnóstico.
- **Uso de medicamentos:** Usted debe continuar con los medicamentos prescritos por su médico, no los debe suspender, sólo debe informar a nuestro personal que medicamentos está tomando antes de iniciar el examen.
- **Suspensión de medicamentos:**
 - Si está tomando algún medicamento que contenga inhibidores de la fosfodiesterasa, suspéndalo el día anterior al examen.
 - No debe ingerir medicamentos tales como ASPIRINA, ASPIRINETA, ASAWIN, MOTRIN, IBUPROFENO, DICLOFENACO, ALKASETLZER, VOLTAREN, SAL DE FRUTAS, o cualquier otro analgésico o anti-inflamatorio, excepto ACETAMINOFEN, DOLEX, diez (10) días antes del procedimiento. Si Usted conoce haber ingerido estos medicamentos, por favor llame a nuestras líneas de atención para poder reprogramarle la cita.
- Si usted está recibiendo **medicamentos anticoagulantes** como WARFARINA, CUMADIN, HEPARINA, debe informar a su médico tratante, antes de solicitar la cita.

RECOMENDACIONES:

- Recuerde llegar quince (15) minutos antes de la hora de su cita, traer orden médica, autorización si la requiere y documento de identidad, o los requisitos previamente descritos por nuestro personal.
- Si usted lo considera necesario, venga acompañado por familiar o persona cercana que pueda asistirle.
- En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron, por favor avísenos con al menos veinticuatro (24) horas de anticipación, la cancelación de la misma.

CUIDADOS POSTERIORES:

- Si la erección dura más de cuatro (4) horas, debe acudir al servicio de urgencias y comunicar el procedimiento realizado y el nombre del medicamento administrado.
- La reacción adversa más frecuente tras la inyección intracavernosa de Caverject es dolor del pene, en la mayoría de los casos de intensidad leve o moderada; si persisten la erección y el dolor no manejable, debe consultar al servicio de urgencias.